Conceito de Fonoaudiologia Hospitalar Diferenciação do Atendimento Hospitalar E Ambulatorial Unidades Hospitalares

M.Sc. Prof.^a Viviane Marques

Fonoaudióloga, Neurofisiologista e Mestre em Fonoaudiologia
Coordenadora da Pós-graduação em Fonoaudiologia Hospitalar
Diretora da Empresa FONOVIM Fonoaudiologia Neurológica LTDA
Coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia do HUGG
Docente do Mestrado de HIV/AIDS UNIRIO
Presidente do Projeto Terceira Idade Saudável

<http://www.fonovim.com.br>

Parte desse material foi gentilmente sedido pelo Prof^o Márcio Moreira.

**CONCEITO DE FONOAUDIOLOGIA
HOSPITALAR**

**CUIDADOS FONOAUDIOLÓGICOS AO
PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE
HOSPITALAR**

FONOATERAPIA À BEIRA DO LEITO

Barros & Carrara de-Angelis (2009), salientam que a atuação hospitalar ainda é recente e um dos pontos positivos é a proximidade com a equipe multidisciplinar e interdisciplinar.

Disponibilidades de recursos diagnósticos e tratamento no mesmo ambiente.

- Campos de atuação:**
- Urgência e Emergência
 - Enfermarias
 - Unidades Semi-Intensivas
 - UTI Adulto
 - UTI Neonatal
 - UTI Pediátrico

OBJETIVOS DA FONOATERAPIA À BEIRA DO LEITO

- Prevenção
- Diagnóstico
- Reabilitação

Redução e prevenção das alterações relacionadas com a deglutição e fala

Adequação das funções do sistema sensório motor oral e retorno da alimentação por via oral de forma segura e eficaz

↓
Risco de
broncoaspiração

QUALIDADE DE
VIDA

**OBJETIVOS DA
FONOATERAPIA À
BEIRA DO LEITO**

**COMPROMETIMENTO
DO PROFISSIONAL EM
DEDICAR-SE E
ESTUDAR SEMPRE**

**CONCEITO DE FONOAUDIOLOGIA
HOSPITALAR**

**VOZ, FALA E
LINGUAGEM**

DEGLUTIÇÃO

**CUIDADOS FONOAUDIOLÓGICOS
HOSPITALARES**

- AO RECÉM-NASCIDO**
- ADULTO**
- IDOSO**

- CLÍNICAS ESPECIALIZADAS:**
- ❖ NEONATOLOGIA
 - ❖ ONCOLOGIA
 - ❖ GERIATRIA
 - ❖ GERONTOLOGIA
 - ❖ PEDIATRIA
 - ❖ CLÍNICA MÉDICA
 - ❖ GASTROENTEROLOGIA
 - ❖ DERMATOLOGIA
 - ❖ REUMATOLOGIA
 - ❖ PNEUMOLOGIA
 - ❖ OTORRINOLARINGOLOGIA
 - ❖ RADIOTERAPIA
 - ❖ CARDIOLOGIA
 - ❖ NEUROLOGIA
 - ❖ INFECTOLOGIA
 - ❖ TERAPIA INTENSIVA

CUIDADOS FONOAUDIOLÓGICOS HOSPITALARES

AO RECÉM-
NASCIDO

ADULTO

IDOSO

ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS:

- ❖ CIRURGIA CABECA E PESCOÇO
- ❖ CIRURGIA TORÁCICA
- ❖ CIRURGIA GERAL
- ❖ CIRURGIA DERMATOLÓGICA
- ❖ CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL
- ❖ CIRURGIA CRÂNIO-MAXILOFACIAL
- ❖ CIRURGIA POR ENDOSCOPIA
- ❖ CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA
- ❖ CIRURGIA BARIÁTRICA

**CUIDADOS FONOAUDIOLÓGICOS
HOSPITALARES**

**AO RECÉM-
NASCIDO**

ADULTO

IDOSO

**ESPECIALIDADES
ASSISTENCIAIS:**

- ❖ ENFERMAGEM
- ❖ FISIOTERAPIA
- ❖ TERAPIA OCUPACIONAL
 - ❖ NUTRIÇÃO
 - ❖ PSICOLOGIA
 - ❖ FARMÁCIA

DIFERENCIAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

HOSPITALAR

AMBULATORIAL

**PACIENTE
CRÍTICO
CUIDADOS MAIS
DIRECIONADOS**

**PACIENTE
ESTÁVEL
CUIDADOS DE
MANUTENÇÃO**

ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
É a prestação de serviços de
saúde a pacientes em
estabelecimento (de saúde),
em regime de não
internação.

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
É aquela que tem por base a ação
de um serviço médico e demais
atendimentos realizados no âmbito
hospitalar, **em regime de
internação.**

UNIDADES DE INTERNAÇÃO

PEDIATRIA

- * Pacientes até 14 anos
- * Divisão grupo etário
- * Até 70 leitos

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

- * Condições de isolamento
- * Até 30 leitos
- *

DOENÇAS MENTAIS AGUDAS

- * Pacientes portadores de doenças mentais
- * Até 30 leitos

UNIDADES DE INTERNAÇÃO

TUBERCULOSE

- * Forma aguda
- * Isolamento respiratório
- * Até 30 leitos

UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

- * Pacientes em estado grave
- * Possibilidades de recuperação
- * Assistência permanente
- * Uso de tecnologia

BERÇÁRIO

- * Assistência, recém-nascidos
sadios, prematuros e
patológicos

UNIDADE DE EMERGÊNCIA

- * Atendimento, diagnóstico e
tratamento
- * Acidentes/ mal súbito
- * Com ou sem risco de vida

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

É o conjunto de elementos onde está localizada a maioria dos serviços que complementam o diagnóstico, ou auxiliam na recuperação da saúde, tais como: laboratório de patologia clínica, radiologia clínica, hemoterapia, laboratório de anatomia patológica, eletrocardiografia, eletroencefalografia, fisioterapia, radioisótopos, medicina nuclear e outros.

OUTRAS UNIDADES

- **UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS**
- **UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO**
- **UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS
OU AMBULATÓRIO**

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Emergência e urgência reside em dois pontos: na primeira o aparecimento é súbito e imprevisto, na segunda não; toda emergência exige solução imediata; e urgência, em curto prazo, havendo emergência e urgência reside em dois pontos: na primeira o aparecimento é súbito e imprevisto, na segunda não; toda emergência exige solução imediata; e urgência, em curto prazo, havendo apenas premência ou insistência de solução. Ambas têm em comum a periculosidade apenas premência ou insistência de solução. Ambas têm em comum a periculosidade.

ENFERMARIAS

**PACIENTE MAIS
ESTÁVEL/
NECESSITANDO DE
MÍNIMOS CUIDADOS**

UNIDADE SEMI-INTENSIVA

**O PACIENTE AINDA
REQUER VIGILÂNCIA NO
CUIDADO**

UTI - ADULTO

**CUIDADOS INTENSIVOS PARA
ADULTOS/ PODE SER DIVIDIDA POR
ESPECIALIDADES**

UTI - NEONATAL

- CUIDADOS INTENSIVOS COM RECÉM NASCIDO – 0 A 28 DIAS
- CUIDADOS INTENSIVOS COM PREMATUROS

UTI - PEDIÁTRICA

- CUIDADOS INTENSIVOS EM LACTENTES E CRIANÇAS ATÉ OS 14 ANOS
- ADOLESCENTE: 15 ANOS ATÉ OS 18 ANOS

As definições de disfagia encontradas na literatura são descritas de forma distintas. Porém, a noção mais freqüente entre os autores é que a disfagia é uma dificuldade de deglutição.

Definição mais completa:

Disfagia é a dificuldade de deglutição relacionada ao funcionamento das estruturas orofaringolaríngeas e esofágicas, dificultando ou impossibilitando a ingestão oral segura, eficaz e confortável de saliva, líquidos e/ou alimentos de qualquer consistência, podendo ocasionar desnutrição, desidratação, aspiração, desprazer e isolamento social, além de complicações mais graves como a pneumonia aspirativa e o óbito;

As disfagias orofaríngeas são tratadas pela Fonoaudiologia

RESOLUÇÃO CFF^a N^o 356, de 6 de dezembro de 2008

“Dispõe sobre a competência técnica e legal do fonoaudiólogo para atuar nas disfagias orofaríngeas.”

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei n^o 6.965, de 09 de dezembro de 1981 e pelo Decreto n^o 87.218, de 31 de maio de 1982, e

Considerando a Lei n^o 6.965/81, em especial o parágrafo único do art. 1^o, o art. 4^o e o art. 5^o;

Considerando o Código de Ética Profissional da Fonoaudiologia;

*Considerando o Documento Oficial CFFa n^o 01/2002, aprovado pela Resolução CFFa n^o 348, de 03 de abril de 2007, onde são estabelecidas **as áreas de competência do fonoaudiólogo, incluindo a promoção da saúde, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação/reabilitação), monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiológicos envolvidos no sistema miofuncional orofacial e cervical e na deglutição;***

Considerando a Classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia, aprovada pela Resolução CFFa 351, de 1º de março de 2008, que define os procedimentos de diagnose e tratamento em Motricidade Orofacial;

Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fonoaudiologia instituídas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES Nº 5, de 19 de fevereiro de 2002;

Considerando as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para a Atuação Fonoaudiológica em Disfagia Orofaríngea – Gestão 2006-2007;

Considerando o Estudo realizado pelo Comitê de Disfagia do departamento de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a pedido do Conselho Federal de Fonoaudiologia, em 01 de julho de 2008;

Considerando que os cursos de Fonoaudiologia contemplam disciplinas específicas sobre o desenvolvimento sensório-motor das estruturas relacionadas à deglutição e as demais funções neurovegetativas no recém-nascido, na criança, no adolescente, no adulto e no idoso e disciplinas relacionadas à aquisição da linguagem e aos aspectos motores da fala, assim como aos aspectos relacionados à voz, ressonância, respiração, sucção, mastigação, deglutição e articulação;

Considerando os grandes avanços conquistados pela ciência fonoaudiológica em Disfagia Orofaríngea e a expressiva produção científica fonoaudiológica em revistas indexadas e livros, bem como o grande número de pesquisas de graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado, doutorado em Disfagia Orofaríngea que são desenvolvidos em instituições de ensino das mais diversas regiões do Brasil;

Considerando que a deglutição é um processo dinâmico que envolve uma atividade neuromuscular complexa cujo objetivo é o transporte do bolo alimentar e a proteção das vias aéreas;

Considerando que o processo de deglutição se divide em fases: oral, faríngea e esôfago-gástrica e se inter-relaciona com outras funções como sucção e mastigação e funções laríngeas;

Considerando que a disfagia orofaríngea é uma alteração de deglutição relacionada à área fonoaudiológica de Motricidade Orofacial, área essa de fundamental importância na atenção aos diversos transtornos fonoaudiológicos;

Considerando o conceito de disfagia definido pelo vocabulário técnico-científico em Motricidade Orofacial do Comitê de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Documento Oficial 04/2007;

Considerando que a disfagia é a dificuldade de deglutição relacionada ao funcionamento das estruturas orofaringolaríngeas e esofágicas, dificultando ou impossibilitando a ingestão oral segura, eficaz e confortável de saliva, líquidos e/ou alimentos de qualquer consistência, podendo ocasionar desnutrição, desidratação, aspiração, desprazer e isolamento social, além de complicações mais graves como a pneumonia aspirativa e o óbito;

-

Considerando o Parecer CFFa/CS nº 32 de 05 de abril de 2008, que “Dispõe sobre a possibilidade do fonoaudiólogo ministrar cursos sobre ausculta cervical e aspiração endotraqueal”;

Considerando que a deglutição e a alimentação são processos complexos, inter-relacionados e distintos e que a Disfagia Orofaringea é um distúrbio de deglutição e não um distúrbio de alimentação;

Art.1º - O fonoaudiólogo é o profissional legalmente habilitado para realizar a avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológicos das disfagias orofaríngeas, bem como o gerenciamento destas no recém-nascido, na criança, no adolescente, no adulto e no idoso;

Art.2º - Na atuação relacionada ao processo de deglutição, cabe ao fonoaudiólogo, entre outros procedimentos:

- I. Orientar a equipe de saúde para a identificação de indivíduos com risco para disfagia e no encaminhamento para avaliação fonoaudiológica;**
- II. Avaliar, classificar e fazer o diagnóstico funcional da sucção, mastigação e deglutição, utilizando, entre outros, instrumentos padronizados, buscando identificar a fisiopatologia deste processo;**
- III. Analisar o processo da deglutição observando a presença dos aspectos funcionais esperados para cada uma das suas etapas;**

- IV. Realizar o tratamento - habilitação/ reabilitação/ compensação/ adaptação e gerenciamento dos distúrbios de deglutição;**
- V. Prescrever a consistência alimentar, o volume, o ritmo de oferta, os utensílios, as manobras e posturas necessárias para administração da dieta via oral de forma segura;**
- VI. Realizar as intervenções necessárias junto ao indivíduo com disfagia orofaríngea, mensurando a eficácia dos procedimentos, para que o mesmo possa minimizar, compensar ou adaptar-se às dificuldades de deglutição;**

VII. Colaborar, junto à equipe, na indicação de colocação e de retirada da via alternativa de alimentação, quando classificado o risco da alimentação via oral;

VIII. Elaborar e conduzir os procedimentos relativos à oferta da dieta, manobras compensatórias e técnicas posturais durante o exame de videoendoscopia da deglutição ou videofluoroscopia

da deglutição, realizar análise e laudo funcional da deglutição orofaríngea;

IX. Realizar e analisar os dados provenientes da eletromiografia de superfície, ausculta cervical, entre outros exames coadjuvantes à avaliação e ao tratamento dos distúrbios da deglutição;

- X. Realizar, quando necessário, procedimentos de limpeza das vias aéreas superiores antes, durante e/ou após a execução de procedimentos fonoaudiológicos;**
- XI. Gerenciar programas de reabilitação dos distúrbios da deglutição e definir indicadores apropriados de qualidade para controle dos resultados;**
- XII. Atuar como perito e/ou como auditor em situações nas quais esteja em questão o processo de deglutição normal ou alterado;**
- XIII. Conduzir pesquisas relacionadas à atuação na área da disfagia orofaríngea para benefício da assistência à comunidade e do ensino profissional.**

ROTINAS HOSPITALARES

Triagem
Fonoaudiológica

Avaliação
Parecer

Conduta
Prontuários
Relatórios

Equipe
Multidisciplinar
Round

Sinais vitais

Frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto.

Quando o número de batimentos é abaixo de 60 vezes por minuto, incluindo o valor 60, por convenção tem-se a chamada Bradicardia.

Faixa normal
O coração humano bate entre 60 e 100 vezes por minuto.

Quando o número de batimentos é acima de 100 vezes por minuto, incluindo o 100, por convenção tem-se a chamada Taquicardia.

Saturação

O oxímetro de pulso é um dispositivo médico que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue de um paciente. Em geral é anexado a um monitor, para que os profissionais de saúde possam ver a oxigenação em relação ao tempo. O monitor exibe a porcentagem de hemoglobina arterial na configuração de oxiemoglobina. Taxas normais são da ordem de 95 a 100%.

Pressão arterial

Não existe uma combinação precisa de medidas para se dizer qual é a pressão normal, mas em termos gerais, diz-se que o valor de 120/80 mmHg é o valor considerado ideal. Contudo, medidas até 145 mmHg para a pressão sistólica, e 90 mmHg para a diastólica, podem ser aceitas como normais.

Histórico da Ventilação Mecânica

- Pulmão de aço – 1950
- 1ª geração
- 2ª geração
- 3ª geração
- 4ª geração

Abd: abdômen
ABO: tipo sanguíneo ABO
ACC: acesso ao cuidado e continuidade do cuidado
ACM: a critério médico
ACTH: hormônio adrenocorticotrófico
AIDS/HIV: síndrome da imunodeficiência adquirida
AD: átrio direito
AE: átrio esquerdo
AIH: autorização de internação hospitalar
amp: ampola
AOE: abertura ocular espontânea
AOP: avaliação dos pacientes
AP: antecedentes pessoais
AR: aparelho respiratório
ASC: anestesia e cirurgia
ASSPLAN: assessoria de planejamento
ATC: angioplastia
avc: acesso venoso central
AVE: acidente vascular encefálico
AVEI: acidente vascular encefálico isquêmico
AVEH: acidente vascular encefálico hemorrágico
AVP: acesso venoso periférico
BAV: bloqueio atrioventricular
BAVT: bloqueio átrio ventricular total
BCP: broncopneumonia
BEG: bom estado geral
BE: excesso de base

CEST: complacência estática
CH: concentrado de hemácias
CIA: comunicação intra atrial
CIVD: coagulação intravascular disseminada
CID: classificação internacional de doenças
CIPA: comissão interna de prevenção de acidentes
CIV: comunicação interventricular.
CKMB: fração da enzima CPK
cm: centímetros
COREME: comissão de residência médica
COP: cuidados aos pacientes
CPAP: pressão positiva contínua nas vias aéreas
CPK: creatinina fosfoquinase
CPT: capacidade pulmonar total
Cr: creatinina
CRF: capacidade residual funcional
CRM: conselho regional de medicina
CT: tomografia computadorizada
CV: capacidade vital
CVC: cateter venoso central
CVE: cardioversão elétrica
CX: circunflexa
d: dia
DAF: diretoria administrativa financeira
DC: débito cardíaco
DD: decúbito dorsal
DDAVP: desmopressina

EF: exame físico
EV: endovenoso
FA: fibrilação atrial
FC: frequência cardíaca
fco: frasco
FIO2: fração inspiratória de oxigênio
F.O.: Ferida operatória
FMS: gerenciamento e segurança das instalações
FR: frequência respiratória
FSH: hormônio folículo-estimulante
FV: fibrilação ventricular
FAV: fistula arteriovenosa
g: gramas
G+: gram positivo
G-: gram negativo
GE: gerencia de Enfermagem
GLD: governo, liderança e direção
h: hora
H2O: água
HAS: hipertensão arterial sistêmica
Hb: hemoglobina
HBV: vírus da hepatite B
HCV: vírus da hepatite C
HDA: história da doença atual
HD: hemodiálise
HF: hemofiltração
HGV: hospital getúlio vargas
HMG: hemograma
HP: hipertensão pulmonar
HTA: histerectomia total abdominal

BH: balanço hídrico
BIC: bomba de infusão contínua
Bic: bicarbonato
BIPAP: Positive Airway Pressure
BNF: bulhas normo fonéticas
bpm: batimento por minuto
BRD: bloqueio de ramo direito
BRE: bloqueio de ramo esquerdo
Ca: cálcio
CA: câncer
CAPD: dialise peritoneal ambulatorial continua
CAT: cateterismo
CAV: comunicação atrioventricular
CBA: consórcio brasileiro de acreditação
CC: centro cirúrgico
CCIH: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CCGG: cuidados gerais
Cd: conduta
CE: corpo estranho
CEE: comissão de ética em enfermagem
CEM: comissão de ética médica
CEP: comissão de ética em pesquisa
C.Din: complacência dinâmica

DepO2: dependência de oxigênio
dg: drágea
DHL: desidrogenase láctica
DIH: dia de internação Hospitalar
DI: diabetes insípido
DG: diretoria geral
DL: duplo lúmen
DTA: diretoria técnica assistencial
dl: decilitro
DM: diabete mellitus
DLD: decúbito lateral direito
DLE: decúbito lateral esquerdo
DP: diálise peritoneal
DIP: doença inflamatória pélvica
DPO: dia de pós-operatório
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica
DRGE: doença do refluxo gastroesofágico
DT: dreno de tórax
DV: decúbito ventral
DVE: derivação ventricular externa
DVP: derivação ventricular peritoneal
ECG: eletrocardiograma
ECO: ecocardiograma
EEG: eletroencefalograma

Htc: hematócrito
HTD: hemitórax direito
HTE: hemitórax esquerdo
HTV: histerectomia total via vaginal
HVD: hipertrofia ventricular direita
HVE: hipertrofia ventricular esquerda
IAM: infarto agudo do miocárdio
IC: insuficiência cardíaca
ICC: insuficiência cardíaca congestiva
ID: intradérmica
IM: intramuscular
IPSG: metas internacionais de segurança do paciente
IRA: insuficiência renal aguda
IRpA: insuficiência respiratória aguda
IRC: insuficiência renal crônica
ITU: Infecção do trato urinário
IV: intravenoso
JCI: joint commission international
K: potássio
Kg: quilograma
L: litro
LCR: líquido cefalorraquidiano

L.E.C.O: Litotripcia extracorpórea
LES: lúpus eritematoso sistêmico
LFD: Linfadenectomia
LH: hormônio luteinizante
m: metro
MCI: gerenciamento da comunicação e informação
mEq: miliequivalente
mg: miligrama
Mg: magnésio
min: minuto
ml: mililitro
MID: membro inferior direito
MIE: membro inferior esquerdo
mm: milímetro
mmHg: milímetros de mercúrio
MMII: membros inferiores
MMSS: membros superiores
MMU: gerenciamento e uso de medicamentos
MP: marcapasso
MSD: membro superior direito
MSE: membro superior esquerdo
MV+: murmúrio vesicular presente
Na: sódio
NEP: Núcleo de Educação Permanente
NPP: nutrição parenteral parcial
NPT: nutrição parenteral total
NO: óxido nítrico
OD: olho direito
OE: Olho Esquerdo
OPO: organização procura de órgãos

PS: pronto-socorro
PSAT: antígeno prostático específico total
PSAL: antígeno prostático específico livre
PSV: ventilação com pressão de suporte
PTV: prostatectomia supra-púbica
PVC: pressão venosa central
QRS: complexo QRS do eletrocardiograma
QP: queixa principal
QPS: melhoria da qualidade e segurança do paciente
QT: intervalo QT do eletrocardiograma
RA: ruídos adventícios
RCI: ritmo cardíaco irregular
RCR: ritmo cardíaco regular
REOP: reoperação
REG: regular estado geral
RHA: ruído hidroaéreo
RJ: ritmo juncional
RNM: ressonância nuclear magnética
RPA: recuperação pós-anestésica
RL: ringer lactato
rpm: respiração por minuto
RS: ritmo sinusal
RTU: ressecção transuretral
RX: raios X
SAME: serviço de arquivo médico e estatístico

TB: tuberculose
TC: tempo de coagulação
TCE: traumatismo cranioencefálico
TEP: tromboembolismo pulmonar
TGO: transaminase glutamicooxalacética
TGP: transaminase glutamico-piruvica
TR: toque retal
TS: tempo de sangramento
TV: taquicardia ventricular
TVP: trombose venosa profunda
TTPA: tempo de tromboplastina parcial ativado
TSH: hormônio estimulante da tireóide
Tx: transplante
TU: tumor
T3: triiodotironina
T4: tiroxina
U: unidade
UF: ultrafiltração
UI: unidades internacionais
Ur: uréia
US: ultra-sonografia
UTI: unidade de terapia intensiva
VM: ventilação mecânica
VAS: vias aéreas superiores
VC: volume corrente
VCV: ventilação controlada a volume
VD: ventrículo direito
VE: ventrículo esquerdo
VJD: veia jugular direita

P: pulso
PA: pressão arterial
PAO₂: pressão alveolar de oxigênio
PaO₂: pressão arterial de oxigênio
PAM: pressão arterial média
PAP: pressão da artéria pulmonar
PAD: pressão arterial diastólica
PAS: pressão arterial sistólica
PCI: prevenção e controle de infecções
PCO₂: pressão parcial de gás carbônico
PCR: parada cardíaca respiratória
PEEP: pressão positiva expiratória final
pH: potencial de hidrogênio
PCV: ventilação com pressão controlada
PFE: educação de pacientes e familiares
PFR: direito dos pacientes e familiares
PIC: pressão intracraniana
PIP: pressão de pico inspiratório
PL: punção lombar
PNM: pneumonia
POI: pós-operatório imediato
POT: pós-operatório tardio

SARA: síndrome da angústia respiratória aguda
SC: subcutânea
seg: segundo
SESAPI: secretaria de saúde do estado
SF: soro fisiológico
SG: soro glicosado
SIC: segundo informações colhidas.
SIMV: ventilação mandatória intermitente sincronizada
SL: sublingual
SNC: sistema nervoso central
SNG: sonda nasogástrica
s/n: se necessário
SNE: sonda nasoenteral
SOG: sonda orogástrica
SQE: educação e qualificação de profissionais
SpO₂: saturação percutânea de oxigênio
SVA: sondagem vesical de alívio
SVD: sondagem vesical de demora
SSVV: sinais vitais
Tax: temperatura axilar
TI: tempo inspiratório
TOT: tubo oro traqueal
TAP: Tempo de atividade da protrombina

VJE: veia jugular esquerda
VMin: volume minuto
VNI: ventilação mecânica não invasiva
VO: via oral
VPP: ventilação com pressão positiva
VR: volume residual
VS: volume sistólico
VSCD: veia subclávia direita
VSCE: veia subclávia esquerda

AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DO PACIENTE COM DISFAGIA

A avaliação clínica da deglutição, e do estado da musculatura envolvida no processo, devem ocorrer antes de qualquer avaliação instrumental, pois ela determinará se haverá necessidade de exame complementar e qual o mais apropriado para cada caso.

DISFAGIA
SINTOMA

**GRAU DE
SEVERIDADE DAS
DISFAGIAS**

CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS DISFAGIAS

As classificações existentes consideram como critério prioritário a penetração laríngea e a aspiração traqueal para definir o grau de comprometimento, mas se considera também a condição pulmonar, hidratação, condição nutricional e prazer de alimentar do paciente.

**Disfagia leve: trânsito orofaríngeo
levemente comprometido e sem sinais
sugestivos de aspiração**

LYTEL
ELIZABETH

Material: 100% Cotton
Length: 100cm
Color: 100% Cotton

100% Cotton
100% Cotton
100% Cotton

100% Cotton
100% Cotton
100% Cotton

Disfagia moderada: trânsito orofaríngeo comprometido apresentando sinais sugestivos de riscos de aspiração com preservação de mecanismos protetores.

Disfagia grave: Trânsito orofaríngeo comprometido com sinais sugestivos de aspiração e ausência de mecanismos protetores

**Estabelecer a alimentação via oral
mais precocemente, diminuir a
utilização da alimentação enteral.
Reduzir a indicação de gastrostomia.**

A intervenção fonoaudiológica precoce em emergência e UTI visa a detecção rápida de disfagia e a intervenção estimulativa auxilia na diminuição dos riscos de agravamento do quadro clínico do paciente e do aumento das chances de um prognóstico positivo, o que possibilitará a redução do tempo de internação.

A transição da alimentação via oral para uma via alternativa de alimentação e também da via alternativa para a via oral deve ser acompanhada por um fonoaudiólogo e este estar em constante contato com a equipe multiprofissional para um decisão assertiva e segura.

Dentre os objetivos da presença do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar, estão auxiliar a equipe multidisciplinar a promover altas mais rápidas e seguras, reduzir custos hospitalares, reduzir comorbidades, mortalidade e promover qualidade de vida.

**“A única forma de fazer um excelente trabalho
é amar o que você faz”.**

Steve Jobs

Obrigada pela atenção!

www.fonovim.com.br

vivianemarquesfono@hotmail.com

(21) 98141813

Empresa FONOVIM Fonoaudiologia Neurológica LTDA

SITES PARA PESQUISA

- SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA – www.sbfa.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA – www.sbp.com.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – www.cardiol.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA – www.sbpt.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA INTENSIVA – www.amib.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA – www.sboc.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA CRANIOMAXILOFACIAL – www.abccmf.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – www.soben.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA – www.sbf.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROLOGIA – www.sbn.com.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA – www.infectologia.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – www.abo.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA – www.sbggrj.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA – www.aborlccf.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR – www.sbrafh.org.br
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL –
www.sbnpe.com.br

Parte desse material foi gentilmente sedido pelo Profº Márcio Moreira.

www.fonovim.com.br

SEM O PASSO
INICIAL, NINGUÉM
VENCE AS
DISTÂNCIAS.

JOANNA DE ANGELIS